



Rawicz, 11 kwietnia 2025r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RAWICZU

Magdalena Ogińska

**Hodowcy zwierząt gospodarskich,
Myśliwi,
Pracownicy Lasów Państwowych
powiatu rawickiego**

Nasz znak: ChZ.510.1.32.2025

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

W związku z zaistniałym zagrożeniem wystąpienia **pryszczycy**, choroby zakaźnej, która dotyczy m.in. **bydła, owiec, kóz, świń oraz innych gatunków zwierząt parzystokopytnych**, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawiczu zwraca się z uprzejmą prośbą o **zapoznanie się z ulotką informacyjną** która znajduje w załączniku do pisma oraz poniższą informacją dotyczącą choroby:

Pryszczycą jest chorobą zakaźną wywoływana jest przez wirus FMD
(Foot and mouth disease).

Najbardziej podatne na zakażenie jest bydło, następnie świnię, owce i kozy. **Chorują też zwierzęta dzikie- sarny, jelenie, danielę, żubry, dziki.** Choroba jest silnie zaraźliwa i jest chorobą zwalczaną z urzędu. Oznacza to, że **wystąpienie w gospodarstwie tej choroby oznacza obowiązkową likwidację stada.**

Objawy pryszczycy :

Najbardziej charakterystycznym objawem pryszczycy u przeżuwaczy jest występowanie pęcherzy na błonie śluzowej pyska, które przechodzą we wrzodziejące ranki. Towarzyszy temu silny ślinotok.

Pęcherze i owrzodzenia występują także na skórze wymienia i strzyków oraz w okolicach koronki racic i w szparze międzyraccicznej.

Źródła zakażenia:

- zakażone zwierzęta i wydychane przez nie powietrze
- wszystkie wydzieliny chorego zwierzęcia: ślina, mleko, kał
- skóra i wełna



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul.Kopernika 8, 63-900 Rawicz

tel.:(65) 545-22-67, fax: (65) 546-73-95, e-mail:piwrawicz@wiw.poznan.pl, www.piwrawicz.pl

- pasza, woda (wirus może przetrwać w wodzie 50 dni) i pastwisko (wirus może przetrwać 74 dni)
- mięso i jego przetwory nie poddane odpowiedniej obróbce (co najmniej 56 ° C przez 30 minut)
- nasienie i zarodki
- żłoby, podłogi, środki transportu, narzędzia i sprzęt używany przy pracy ze zwierzętami wrażliwymi, ręce, odzież i obuwie obsługi, gryzonie, ptaki
- odpadki kuchenne.

Największa koncentracja wirusa znajduje się w płynie surowiczym i nabłonku pojawiających się pęcherzy.

Choroba jest zaraźliwa także dla ludzi. Nie jest jednak niebezpieczna dla życia – występują najczęściej tylko objawy grypopodobne.

Zalecenia dla Hodowców:

Ostatni przypadek FMD w Polsce stwierdzono w 1971 r. Polska jest uznana za kraj urzędowo wolny od tej choroby przez Światową Organizację ds. Zdrowia Zwierząt (OIE). Jednak, ze względu na jej silną zaraźliwość i katastrofalne skutki, jakie wystąpienie choroby może spowodować, **polscy hodowcy przeżuwaczy oraz świń powinni zachować najdalej idące środki ostrożności.**

W celu ochrony stada przez wniknięciem wirusa pryszczycy należy:

- Wstrzymać przyjmowanie do gospodarstwa jakichkolwiek zwierząt parzystokopytnych – cieląt, krów, buhajów, świń.
- Należy podjąć wszelkie możliwe środki bioasekuracji – wprowadzić maty dezynfekcyjne, stosować dezynfekcję **wszystkich** wjeżdżających pojazdów
- Zabronić osobom postronnym wstępu do budynków inwentarskich
- Wymagać od osób pracujących w gospodarstwie (lekarze weterynarii, doradcy itp.) stosowania odzieży jednorazowej i odkażania obuwia
- Należy zachować szczególną higienę doju, przechowywania pasz, karmienia zwierząt, dystrybucji wody,
- Uniemożliwić kontakt zwierząt gospodarskich z dzikimi zwierzętami z gatunków wrażliwych

Substancje zalecane do dezynfekcji:

Wirus pryszczycy jest wrażliwy na pH powyżej 9 (zasadowe), oraz poniżej 6 (kwaśne).

Zgodnie z wytycznymi WOAH dostępnymi pod linkiem:

<https://www.woah.org/en/document/technical-disease-card-fmd/>

środkami dezynfekującymi inaktywującymi wirusa pryszczycy są:

- wodorotlenek sodu (2%),



- węglan sodu (4%),
- kwas cytrynowy (0,2%),
- kwas octowy (2%),
- podchloryn sodu (3%),
- peroksymonosiarcezan potasu/chlorek sodu (1%) i dwutlenek chloru.

Uwaga: Wirusa NIE zabijają środki oparte na fenolu, czwartorzędowych związkach amoniowych, oraz środki jodoforowe.

W przypadku występowania niepokojących objawów u zwierząt gospodarskich oraz łownych u których nie można wykluczyć zarażenia wirusem pryszczycy należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii opiekującego się stadem lub Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawiczu.

Załącznik:

Ulotka pryszczycy

**POWIATOWY
LEKARZ WETERYNARII
w Rawiczu**
lek. wet. Magdalena Ogińska



Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Magdalena
Ogińska; PIW Rawicz
Data: 2025.04.11 09:09:30 CEST



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Kopernika 8, 63-900 Rawicz


tel.: (65) 545-22-67, fax: (65) 546-73-95, e-mail: piwrawicz@wiw.poznan.pl, www.piwrawicz.pl

1 TRANSMISJA

Przyczyną jest jedna z najbardziej zaraźliwych chorób zwierząt parzystokopytnych.

Kontakt między zwierzętami jest głównym sposobem przenoszenia i rozprzestrzeniania się choroby, ale również pasza, słoma, obornik, sprzęt, pojazdy i ludzie, którzy mieli kontakt z zakażonymi zwierzętami mogą przenosić wirusa.

Możliwe jest przeniesienie przyczyny wraz z mlekiem, mięsem i innymi produktami pochodzącymi od zakażonych zwierząt, które nie zostały poddane obróbce niszczącej wirusa tej choroby.




2 ZAPOBIEGANIE

Wprowadzanie do gospodarstwa zwierząt o nieznanym stanie zdrowia stanowi bardzo duże zagrożenie dla całego stada. Większość środków zapobiegawczych jest wspólna dla różnych chorób i jest najlepszym i najtańszym sposobem ochrony stada.


UNIKAJ:

- Zakupu zwierząt niezidentyfikowanych, pochodzących z niewiadomego źródła;
- Kontaktów między zwierzętami z różnych stad (np. na pastwisku, kontakt nos w nos przez ogrodzenie);
- Odwiedzania innych hodowli zwierząt bez zachowania zasad bioasekuracji;
- Wspólnego używania narzędzi, sprzętu i pojazdów wykorzystywanych w innych gospodarstwach.



STOSUJ:

- Oddzielne miejsca do izolacji i obserwacji przez 14 dni każdego nowo zakupionego zwierzęcia;



- Odzież i obuwie ochronne do obsługi zwierząt;
- Niecki, maty lub urządzenia do dezynfekcji obuwia przy wejściu do budynków inwentarskich oraz mycie i dezynfekcję rąk.

3 ŚWIADOMOŚĆ

Choroba może powodować bezpośrednie i pośrednie straty ekonomiczne, a stado może być zagrożone. Bardzo ważny jest nadzór nad zdrowiem zwierząt.

Każde podejrzenie przyczyny należy niezwłocznie zgłosić służbom weterynaryjnym.

Powiadomienie jest obowiązkowe i ma zasadnicze znaczenie dla szybkiego zdiagnozowania choroby.

CHOROBA



Pryszczycza to choroba bydła, owiec, kóz, świń i innych zwierząt parzystokopytnych (np. jeleni, saren i dzików), która powoduje powstawanie **pęcherzyków** i **pęcherzy na błonie śluzowej w jamie gębowej, na wargach, języku, w okolicy otworów nosowych oraz na wymieniu, strzykach, w szparze międzyrzecicowej i na koronkach racic**. Zakażone zwierzęta niechętnie się poruszają, mają podwyższoną temperaturę ciała, obserwuje się apatię, kulawiznę i utratę apetytu oraz spadek mleczności, a u **bydła obfite ślinienie**. Ciężarne samice mogą ronić, a młode zwierzęta mogą padać bez widocznych objawów klinicznych.



Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Departament Komunikacji i Promocji MRiRW,
korekta merytoryczna - Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii



PRYSZCZYZA wspólne działanie, wspólne bezpieczeństwo

